



Répartition des groupements végétaux aquatiques et classification des rives au lac Dion

- Plan et cours d'eau
- Route, chemin privé
- Boisé
- Lot, unité d'évaluation, canton
- Courbes bathymétriques (en mètre)
- Limite de la zone agricole
- Localisation des herbiers aquatiques

Identification des herbiers aquatiques

PP	Potamot nain	<i>Potamogeton pusillus L.</i>
N	Naïas souple	<i>Najas flexilis (Willd.) Rostk.</i>
E	Eriocaulon aquatique	<i>Eriocaulon septangulare with.</i>
PC	Potamot crispé	<i>Potamogeton crispus L.</i>
PE	Potamot émergé	<i>Potamogeton epihydrus Raf.</i>
NE	Grand nénuphar jaune	<i>Nuphar variegata Eng.</i>
PO	Pontédérie cordée	<i>Pontederia cordata L.</i>
R	Renouée écarlate	<i>Polygonum coccineum Mühl.</i>
Q	Quenouille	<i>Typha latifolia L.</i>
U	Utrriculaire vulgaire	<i>Utricularia vulgaris L.</i>
RU	Rubanier flottant	<i>Sparganium fluctuans Rob.</i>

Densité de l'herbier

- Faible
- + Modéré
- ++ Dense

Classification des rives

- À caractère naturel (52,0%)
- En régénération (45,5%)
- Ornementale (2,5%)

Source: Fichiers numériques, MRC de Bellechasse, 2001

Partenaires:



Le Club sportif du Lac des Goulet



Ville de Saint-Damien-de-Buckland

Réalisation:



Cartographie:

Danielle Bédard Cartographe

Révisé le 26 novembre 2004